

СН-10Ц з нормою висіву 5,0 млн. схожого насіння на 1 га. Попередник – сидеральний пар. Облікова площа ділянки – 11,55 м². Повторність досліду 4-х кратна. Фунгіциди застосовували у фазах початок трубкування пшениці озимої (T1) та початок колосіння (T2) за схемою: Аканто Плюс, к.с. (0,75 л/га) + Амістар Тріо 255 ЕС, к.е. (1,0 л/га), Таліус 20, к.е. (0,2 л/га) + Тілт Турбо 575 ЕС, к.е. (1,0 л/га), Фалькон 460 ЕС, к.е. (0,4 л/га) + Вареон 520, к.е. (1,0 л/га). Технічну ефективність препаратів визначали згідно з методикою С.О. Трибеля та ін. Технічна ефективність фунгіцидів після застосування у двох фазах становила проти борошнистої роси – 87,5-100 %, проти септоріозу листя – 17,6-48,6 %, проти жовтої іржі – 100 %. Вищі показники ефективності фунгіцидів проти хвороб відмічено на сорти Берегиня миронівська, який є найбільш стійким серед сортів, які ви-

користовувались в дослідженнях. Застосування фунгіцидів забезпечило приріст урожаю на рівні 0,81-1,49 т/га для сорту Берегиня миронівська, 0,98-1,48 т/га для сорту Господиня миронівська і 1,33-1,88 т/га для сорту Горлиця миронівська. Найбільшу урожайність зерна (8,56 т/га) одержано при обприскуванні рослин пшениці озимої сорту Горлиця миронівська фунгіцидами Аканто Плюс 28 (0,75 л/га) в фазі початок трубкування та Амістар Тріо 255 ЕС (1,0 л/га) в фазі початок колосіння, збережений урожай становив 1,88 т/га. Більший приріст урожаю було отримано при застосуванні фунгіцидів на сортах Господиня миронівська та Горлиця миронівська. Вищу ефективність проти хвороб та найбільший показник збереженого урожаю забезпечувала фунгіциди Аканто Плюс 28 у період T 1 та Амістар Тріо 255 ЕС у період T 2.

УДК 633.11:631.529

Замліла Н. П., науковий співробітник

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН України

ОЦІНКА АДАПТИВНОСТІ ПЕРСПЕКТИВНИХ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ МЯКОЇ ОЗИМОЇ

Основна вимога, яка висувається адаптивному сорту це здатність формувати високу врожайність хорошої якості в різних природно-кліматичних умовах. Чим менше адаптований сорт до умов зовнішнього середовища, тим в більшій мірі змінюється хімічний склад зерна під впливом мінливих чинників, що визначають умови, тим більшою мірою варіює якість продукції одержуваного сорту.

Мета досліджень – виокремити лінії пшениці м'якої озимої з підвищеним адаптивним потенціалом за урожайністю і за вмістом клейковини в зерні. Дослідження проводили в Миронівському інституті пшениці після попередників: сидеральний пар (гірчиця) і кукурудза (МВС) (2015 р.); сидеральний пар (гірчиця) і соя (2016 р.). Об'єктом досліджень були лінії пшениці м'якої озимої конкурсного випробування лабораторії селекції озимої пшениці. Інтерпретацію параметрів адаптивності (\bar{X} , max, min, R, ($X_{max}+X_{min})/2$, Cv, Sc, Hom, b_i і S_i^2) проводили згідно відомих методик. Для ранжування ліній і визначення адаптивності використовували метод непараметричної статистики Дж.У. Снедекора та сукупний показник «рейтинг адаптивності сорту» (PEC) В. А. Власенка.

У дослідженнях виділено лінії різного типу пластичності за ознаками урожайності і клейковини в зерні. Крашою загальною адаптивною здатністю порівняно із стандартом Подолянка

(7,60 т/га) (за показником середньої врожайності), володіли всі лінії, серед них найкращі Лютесценс 37391, Лютесценс 37548, з надбавкою (0,62-0,73 т/га). Коєфіцієнт регресії ($b_i=0,58-0,78$) показує, що ці лінії слабше реагують на зміну умов вирощування і їх можна використовувати на екстенсивному фоні. Вони також мали найбільшу стабільність і в (PEC) посіли перші місця. Близький до одиниці (b_i) у Лютесценс 37564, Лютесценс 55198 свідчить про адекватну відповідь на зміну умов вирощування. Найбільш інтенсивними ($b_i=1,14-1,38$) виявилися лінії Лютесценс 37519 і Еритроспермум 55023, які також мають високий потенціал урожайності. Серед досліджуваних ліній найвищим вмістом клейковини ряді середовищ характеризувалися Лютесценс 55198 (25,0 %) і Еритроспермум 55023 (24,8, %), а стандарт Подолянка (20,2 %). За коєфіцієнтом регресії ($b_i=0,43-0,85$) ці лінії належать до гомеостатичних, та стабільних за показником (S_i^2) відносно інших генотипів і в (PEC) також посіли перші місця. Решта ліній за цією ознакою виявилися більш пластичними ($b_i=1,05-1,13$).

Таким чином, серед нових ліній, однією із найперспективніших є Еритроспермум 55023 (Миронівська 29 / Palotas), яка характеризується ранньостиглістю, низькорослістю та високою стійкістю до вилягання, стійкістю проти комплексу хвороб, високими показниками якості зерна, високим показником маси 1000 зерен і урожайністю.