

УДК 631.526 : 633.11/.113

Шпакович І.В.^{1,2}, аспірант, провідний агроном відділу селекції і насінництва зернових культур

Голик Л.М.¹, кандидат с.-г. наук, с.н.с., завідувач відділу селекції і насінництва зернових культур

¹ННЦ «Інститут землеробства НААН України»

²Національний університет біоресурсів і природокористування України

E-mail: irunashpkovich@gmail.com

ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ РОДУ TRITICUM

Міжнародний центр покращення кукурудзи та пшениці (CIMMYT) вкотре звертає свою увагу на необхідність пошуку шляхів підвищення адаптивних властивостей сортів рослин за для забезпечення продовольчої безпеки світу. На вирішення цього питання зоріентований п'ятирічний проект «Пошук корисних алелей для адаптації до змін клімату» з генних банків CGIAR. Його завданням є дослідити генетичні банки на наявність алелей та генних варіацій, що відповідають за стійкість до спеки, посухи, засolenня.

Дикорослі форми були і залишаються первинним матеріалом для створення культурних сортів, адже вони менш вибагливі до ґрунтово-кліматичних умов, переважно є стійкішими до несприятливих абіотичних і біотичних чинників, ніж культурні рослини. Таким чином вони є цінним джерелом адаптивних ознак. Видове різноманіття ж забезпечує в свою чергу потужне джерело цінних ознак і їх варіацій.

Основна зернова культура України – пшениця. Рід *Triticum* (пшениця) включає в себе 28 видів, які в свою чергу відрізняються своєю пloidіністю. До дикорослих серед них відносяться: диплоїдні (*T. boeticum*, *T. thaoudar*, *T. urartu*, *T. aegilopoides*) та тетраплоїдні (*T. dicoccoides*, *T. araraticum*). Культурні види пшениці використовуються по всьому світу в тій чи іншій мірі. В Україні зустрічаються *T. dicoccum*, *T.*

compactum, *T. spelta*, *T. polonicum* та *T. turgidum*, проте найбільшого поширення мають *T. aestivum* та *T. durum*.

Серед основних завдань CIMMYT ставить перед собою забезпечити більш широке і правильно направлене використання біорізноманіття пшениці. За результатами досліджень Л. М. Бабенко та Г. М. Господаренко в 2018 році гексаплоїдна пшениця оркіш або спельта (*T. spelta*) характеризується стійкістю до холоду, надмірного зволоження, є не вибагливою до вирощування, має високий рівень білку, а тому активно використовується в схемах скрещування з тетраплоїдною пшеницею. За інформацією Р.В. Рожкова, який вивчає видове різноманіття роду *Triticum*, природну стійкість до хлібного жука має *T. polonicum*. Важливість використання видового різноманіття ще в 1976 році описали Knott DR, Dvořák J.

Таким чином, попри широке використання пшениці в селекції та промисловості родина *Triticum* має в собі прихований потенціал, який досі досконало не вивчений. З розвитком методів біотехнології в селекції з'являється все більше можливостей для отримання міжвидових гіbridів пшениці та передачі цінних ознак, що спрямовані на підвищення стійкості сучасних сортів до несприятливих біотичних та абіотичних чинників, а також покращення якісних властивостей продукції.

УДК 631.527 : 633.11 "324"

Шпакович І.В., аспірант, асистент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Ковалишина Г.М., доктор с.-г. наук, професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Національний університет біоресурсів і природокористування України

E-mail: irunashpkovich@gmail.com

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СЕЛЕКЦІЇ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ

CIMMYT у себе на офіційній сторінці зазначає, що потреба в пшениці до 2050 року за останніми прогнозами може зрости до 50%. Зміни клімату, що постійно прискорюються, все більше впливають на сільське господарство за рахунок високих температур, не постійних опадів, посух, повеней та інших факторів. З огляду на увесь потенціал пшениці, представлений у генетичних банках світу, вчені дійшли висновку, що за рахунок включення цього видового різноманіття в сучасну селекцію можна підвищити ефективність виробництва рослинної продукції. Керівник групи виконавчого управління CGIAR, Клаудія Садофф звертає увагу на невикористаний потенціал в селекції на адаптивність до змін клімату.

Війна, спричинена військовим вторгненням в Україну, підтриває продовольчу безпеку в усьому світі за рахунок не лише ускладненням експорту та імпорту зернових культур (для прикладу, 80% пшениці Ліван отримує з України), а й створенням перешкод на шляху селекції. Директорка Глобальної програми пшениці в CIMMYT Елісон Бентлі в журналі Nature зазначає, що через припинення роботи міжнародних поштових та кур'єрських послуг, перший раз за десятиліття команда організації не може відправити в Україну покращену зародкову плазму пшениці. У свою чергу Міжнародний центр покращення кукурудзи та пшениці (CIMMYT) повідомляє про проект «Пошук корисних алелів для адаптації до змін клімату» з генних банків CGIAR, що