

і ефективних температур. Умови зволоження аналізувалися за сумою опадів і запасами продуктивної вологої в шарі ґрунту 100 см.

За досліджені роки середня багаторічна дата сівби – 3 травня, що співпадає зі стійким переходом температури повітря через 15 °C. Сходи з'являються в середньому через 12–14 діб. Забезпеченість теплом міжфазного періоду характеризується сумою активних та ефективних температур, за біологічний мінімум кукурудзи прийнято 10 °C. В цілому за період вегетації сума активних температур в середньому становить 1386 °C. Тривалість періоду – 83 доби. Сума ефективних температур – 556 °C. В серед-

ньому за період сума опадів становить 241 мм. Середня температура становить 16,7 °C.

В умовах Тернопільської області в районі станції Бережани кукурудзу на силос збирають після настання фази цвітіння качана. Маса однієї рослини без коріння перед збиранням в середньому за розглянутий період становила 311 г.

В результаті детального дослідження бачимо, що в цілому в районі станції Бережани складаються гарні умови для вирощування та отримання стійких і сталих врожаїв кукурудзи на силос та зелений корм. Про це також свідчить стрімке збільшення площ в останні роки в Тернопільській області.

УДК 633.491:551.585

Костюкевич Т. К., кандидат географічних наук, асистент кафедри агрометеорології та агроекології

Чеботарьова Н. В., студентка

Одеський державний екологічний університет

e-mail: kostyukovich1604@i.ua

ОЦІНКА АГРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ В ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ПРИКЛАДІ СТАНЦІЇ БІЛОПІЛЛЯ

Картопля посідає одне з перших місць серед інших сільськогосподарських культур за універсальністю використання в господарстві. Відрізняється підвищеними вимогами до температурного режиму та погано реагує на температуру ґрунту нижче 7–8 °C, сильно пригноблюється підвищеним рівнем температур – вище 25 °C. Для бульбоутворення оптимальною температурою ґрунту вважається 16–18 °C.

В роботі проводиться оцінка агрокліматичних умов вирощування картоплі в районі станції Білопілля Вінницької області за період 1999–2018 рр.. Аналіз агрокліматичних умов проводився за міжфазними періодами і сполученими агротехнологічними даними, які відповідають цим періодам. Вплив термічного фактору аналізувалося шляхом осереднення температури повітря за період і сумами активних і ефективних температур. Умови зволоження аналізувалися за сумою опадів.

В середньому картоплю в районі станції Білопілля саджають у другій декаді квітня (19 квітня). Сходи в середньому з'являються через 32 днів (21 травня). Сума активних температур за період садіння - сходи становить 356 °C, ефективних – 144 °C. Середня температура повітря – 11,7 °C. Кількість днів у цьому періоді – 32. У середньому за період садіння-сходи сума опадів становить 46 мм. Дата появи суцвіть в середньому припадає на 13 червня. Тривалість періоду

сходи-поява суцвіть в середньому становить 22 дні. Сума активних температур за період становить 394 °C, ефективних – 240 °C. Середня температура повітря – 17,9 °C. У середньому за період сходи-поява суцвіть сума опадів становить 65 мм.

Період від появи суцвіть до цвітіння в середньому для умов станції Білопілля Вінницької області становить 14 днів. Сума активних температур за період становила 286 °C, ефективних – 170 °C. Середня температура повітря дорівнює 19,2 °C. У середньому за період появі суцвіть цвітіння сума опадів становить 39 мм.

В'янення бадилля відбувається при накопиченні суми активних температур 760 °C, ефективних температур – 501 °C, в першій декаді серпня (3 серпня). Середня температура повітря – 20,5 °C. Період цвітіння – в'янення бадилля триває 37 днів. У середньому за період сума опадів становить 99 мм.

В цілому період вегетації триває 105 днів. Сума активних температур за весь період становить 1778 °C, ефективних – 1056 °C. Середня температура повітря – 17,3 °C. У середньому за період сума опадів становить 249 мм.

Агрокліматичні умови в районі станції Білопілля Вінницької області сприятливі для вирощування та отримання стійких врожаїв картоплі, але необхідним є дотримання відповідних агротехнічних заходів.