

Дослідження проведені в НУБіП України на кафедрі технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В.Лесика і ІС НААН України. Об'єктами досліджень були ягоди суниці різних термінів дозрівання сорту Коралова 100. Збирання здійснювали в червні у чотири терміни, схема добрив включала використання різних видів добрив. В результаті поведених досліджень встановлено, що вміст антоціанів в плодах суниці садової коливається в межах від 70 до 110 мг / 100 г сирої речовини. Використані дози мінеральних і органічних добрив не істотно впливають на підвищення концентрації Р-активних антоціанів в ягодах суниці. Але слід зазначити, що в перших двох зборах концентрація була дещо нижчою (70-80 мг/100г). У то же час у ягодах пізніх зборів

вміст антоціанів підвищується в середньому на 11,216,3%. Проведений статистична аналіз даних щодо впливу доз добрив на формування вмістом Р-активних антоціанів і не встановив істотної залежності.

Підводячи підсумки можна зробити наступні висновки: на формування концентрації Р-активних антоціанів в плодах суниці сорту Коралова 100, дози і форми добрив істотно не впливають; більш істотно впливає термін збору (можливо рівень сонячної радіації та температура). Виходячи з отриманих даних, можна також сказати, що ягоди суниці Сорти Коралова 100 третього і четвертого збору мають підвищеною біологічну цінність. Отримані дані доцільно враховувати під час заготівлі, реалізації і виробництві продуктів переробки підвищеної біологічної цінності.

УДК 633.11(324):631.527:631.524.5

Вологдіна Г. Б., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці

Демидов О. А., доктор с.-г. наук, член-кореспондент НААН, директор

Волощук С. І., кандидат с.-г. наук, провідний науковий співробітник відділу біотехнології, генетики і фізіології

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН України

E-mail: galinavologdina27@gmail.com

ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ НА ПІДВИЩЕННЯ КРУПНОСТІ ЗЕРНА В СЕЛЕКЦІЇ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

Проблема підвищення продуктивності колосу завжди була актуальною і вирішується селекціонерами різними шляхами: збільшенням озерненості і генетичним покращенням зав'язування зерен або підвищенням крупності зерна. В умовах Лісостепу України до найбільш генетично детермінованих ознак відносяться маса 1000 зерен і довжина колоса. За даними багатьох досліджень (Г.М. Субота, 1987; Н.Н. Четвертакова, 1994; И. А. Русанов, 2004) високу селекційну цінність мають болгарські зразки – з крупним колосом і зерном, високою озерненістю. За період 1987–2013 рр. за програмою співробітництва між Миронівським інститутом пшениці та Інститутом пшениці і соняшника «Добруджа», Болгарія було досліджено 1470 зразків болгарської селекції з метою виокремлення джерел крупнозерності і створення за їх участю високоврожайних, адаптованих до умов Лісостепу сортів. Кількість зразків, які за масою 1000 зерен перевищували стандарт, коливалась за роками, найбільше їх було в 1996 (14) і 1998 (15) рр. У 1991–1994, 1997, 1999, 2001, 2009, 2010, 2012 рр. всі зразки були на рівні стандарту, а в 1990, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002 2007 рр. – переважали його. Відмінності між окремими зразками були значими: мінімальне значення ознаки – 17,4 г (1989 р.) і 23,5 г (1991 р.), максимальне – 61,0 г (1993 р.), 58,8 г

(1996 р.), 57,0 г (1998 р.). Аналіз коефіцієнтів варіації показав середній ступінь варіювання за цією ознакою ($C_v = 19,7 \%$). Максимальний розмах мінливості був у 1990 р. (30,7–52,4 г) і 1993 р. (40,0–61,1 г), мінімальний – у 2001–2012 рр., коли мінливість не перевищувала 1,0 (2006 р.) – 10,6 (2009 р.) %. Найбільш крупне зерно відмічено в 1994 р. (середнє значення маси 1000 зерен – 51,3 г для зразків і 51,8 г у стандарту), коли із загальної кількості зразків 60 % були на рівні стандарта, а 19 % – перевищували його. У 1989 р. цей показник був найменшим (27,0 г), всі зразки сформували зерно з масою нижче за стандарт (45,9 г). Для вибіркової сукупності кращих зразків за комплексом ознак три чверті (74,1 %) формували крупне зерно з масою вище 40 г. Результати кореляційного аналізу показали, що урожайність з масою 1000 зерен знаходилась в прямому зв'язку середньою ($r = 0,43$) сили. Коефіцієнт детермінації ($R^2 = 0,12$) вказує на те, що 12 % мінливості величини врожайності пояснюються мінливістю показника маси 1000 зерен. Кращі зразки болгарської селекції за крупністю зерна, які стабільно формували масу 1000 зерен понад 40 г: 2514–114, 853/87–44–38, 836/87–2, ‘Милена’, 104/87–76–21, 809/87–5–34, 97/58–1, 2579–30–19. За участю останнього створено крупнозерний сорт ‘Господиня миронівська’.