

гречки входила Україна. Однак у результаті істотного скорочення площ сівби попередні позиції були втрачені. Посівні площі в Україні за останні чотири роки зменшилися до 67,5 (2019 р.), 78,5 (2020 р.) із 188,8 тис. га у 2017 році, а урожайність варіює від 9,7 до 13,1 ц/га. Основними регіонами вирощування гречки в Україні є: Хмельницька, Сумська, Чернігівська, Харківська, Вінницька, Тернопільська області, лідер з виробництва гречки – Житомирщина. Левова частка посівних площ (близько їх половини), а в окремих випадках навіть більше зосереджена у господарствах населення, де часто урожайність на порядок вище від сільськогосподарських підприємств. На жаль, прогнози на 2021 рік щодо структури посівних площ під культурою не втішні.

Для покращення ситуації з обсягами виробництва гречки у 2021 році Уряд України запровадив нові програми держпідтримки агропромислового комплексу - державна підтримка сільгоспвиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь (гречка). На програму передбачено 50 млн грн. Допомога видаватиметься фермерам на площі до 300 га, з розрахунку 3,5 тис. грн на один га (в тому числі і насіннєвим господарствам). В майбутньому планується розширити перелік нішевих культур для яких надаватиметься підтримка. До цього списку можуть потрапити просо, жито та овес.

Ключові слова: *обсяги, гречка, зменшення площ, зміни, державна підтримка, сорт, області.*

УДК 633.34:631531

Вплив удобрення Нітроамофоска-М на показники життєздатності насіння сої сорту Ментор

Панасюк, Р. М.

Львівський національний аграрний університет, вул. В. Великого, 1, м. Дубляни, 80381, Україна,
e-mail: rouslanapanasiuk@ukr.net

Мета. Метою наших досліджень було вивчення впливу нового комплексного добрива Нітроамофоска-М на показники життєздатності насіння сої сорту 'Ментор' у зоні Західного Лісостепу. **Методи.** Польовий, лабораторний, математичної статистики. **Результати.** Наші дослідження проводились впродовж 2017-2019 рр. на дослідному полі кафедри технологій у рослинництві Львівського національного аграрного університету. У дослідженнях використали сорт сої 'Ментор', занесений до Реєстру сортів рослин України у 2013 році. Дослід закладали за такою схемою: 1 – Без добрив (контроль); 2 – Фосфоритне борошно (5 ц/га); 3 – Нітроамофоска-М (2 ц/га); 4 – Нітроамофоска-М (3 ц/га); 5 – Нітроамофоска-М (4 ц/га); 6 – Нітроамофоска-М

(5 ц/га). Результати трирічних досліджень показали, що удобрення досить сильно впливало на інтенсивність початкового росту насіння у порівнянні з контрольним варіантом (без удобрення), внаслідок чого даний показник в межах дослідів знаходиться на рівні 64-84%. Найвищу лабораторну схожість мав варіант з удобрення 4 ц/га та 5 ц/га, найнижчу - варіант без удобрення. На інших варіантах удобрення названий показник становив 98%. **Висновки.** В результаті проведених досліджень одержано, що в умовах Західного Лісостепу використання на посівах сої комплексного мінерального добрива Нітроамофоска-М в нормі 4 ц/га позитивно впливає на показники життєвості та життєздатності насіння (підвищується швидкість проростання, збільшується лабораторна схожість та натурна маса зерна).

Ключові слова: *удобрення, соя, життєздатність, насіння*

Panasiuk Ruslana
<https://doi.org/10.31734/agronomy2020.01.089>